



Australian Government

COVID-19 VACCINATION

لقاحات COVID-19: أسئلة شائعة

هذه المعلومات دقيقة بدءاً من تاريخ 03 مارس 2022.

من يمكنه الحصول على لقاحات COVID-19؟

يمكن لأي شخص يبلغ من العمر 5 سنوات وأكثر في أستراليا الحصول على لقاح COVID-19 مجاناً. إذا كنت تتلقى التطعيم الخاص بك في عيادة التطعيم الحكومية، فلن تحتاج إلى بطاقة Medicare. يمكنك العثور على عيادة وحجز لقاح COVID-19 باستخدام أداة البحث عن اللقاحات <https://covid-vaccine.healthdirect.gov.au/>

لكي تُعتبر مواكباً للتطعيم ضد فيروس COVID-19، يجب أن تكون قد تلقيت كل الجرعات الموصى بها لعمرِك واحتياجاتك الصحية.

يجب أن يتلقى الأطفال من سن 5-15 سنة التالي:

- الجرعة الأولية 1 و 2 من لقاح COVID-19
- الجرعة الأولية 3 إذا كانوا يعانون من نقص المناعة الشديد

يجب أن يتلقى كل شخص يبلغ من العمر 16 عاماً وما فوق التالي:

- الجرعة الأساسية 1 و 2 من لقاح COVID-19
- الجرعة الأساسية 3 إذا كانوا يعانون من نقص المناعة الشديد
- جرعة معززة من لقاح COVID-19

إذا كانت نتيجة فحصك لـ COVID-19 إيجابية، فيمكنك تلقي جرعة لقاح COVID-19 التالية بمجرد اختفاء أعراض الفيروس. ومع ذلك، يمكنك اختيار الانتظار لمدة تصل إلى 4 أشهر.

تمت الموافقة على استخدام أربع لقاحات في أستراليا: Comirnaty (Pfizer) و Spikevax (Moderna) و Nuvaxovid و Vaxzevria (AstraZeneca) و (Novavax).

اقرأ المزيد عن لقاحات COVID-19 بلغتك:

- 1 [لقاح Pfizer](#)
- 2 [لقاح AstraZeneca](#)
- 3 [لقاح Moderna](#)
- 4 [لقاح Novavax](#)

لماذا يجب عليّ تلقي لقاح COVID-19؟

يمكن أن يكون COVID-19 مرضاً خطيراً للغاية. إنه خطير بشكل خاص على الأشخاص المستضعفين في مجتمعنا. يُعد تلقي لقاح من أفضل الطرق لحماية نفسك ومجتمعك من الإصابة بالمرض الشديد أو الوفاة من COVID-19.

تُظهر الأدلة أن لقاحات COVID-19 تساعد على الحد من انتشار الفيروس. من خلال التطعيم، يمكننا إبطاء انتشار الفيروس. وتشير الدلائل البحثية إلى أنه إذا أصيب شخص ما بفيروس COVID-19 بعد التطعيم، فمن غير المرجح أن يتسبب في إصابة الآخرين بالمرض مقارنة بشخص لم يتلق لقاحه.

كيف تعمل لقاحات COVID-19؟

تعمل لقاحات COVID-19 مثل اللقاحات الأخرى. تساعد التطعيمات على تدريب جسم الشخص على التعرف على الفيروسات التي يمكن أن تسبب المرض ومكافحتها، دون أن تصيبك بالمرض نفسه. يساعد لقاح COVID-19 الجسم على التعرف على الفيروس المسبب لـ COVID-19 ومكافحته.

هل لقاحات COVID-19 آمنة؟

إن (Therapeutic Goods Administration (TGA هم العلماء والخبراء الطبيون الذين ينظمون ويوافقون على اللقاحات والأدوية وغيرها من المنتجات الطبية للاستخدام في أستراليا. تتحقق TGA من جميع لقاحات COVID-19 من أجل الجودة والسلامة والفعالية قبل الموافقة عليها لاستخدامها في أستراليا. هذا هو نفس الاجراء الذي تمر به جميع اللقاحات في أستراليا.

يقوم الخبراء الطبيون في TGA بفحص جميع اللقاحات باستمرار للتأكد من أنها آمنة. لا تتم الموافقة على استلام اللقاحات في أستراليا الا بعد تقييمها والموافقة عليها، وتُبين أن فوائد اللقاح تفوق أي مخاطر.

هل تم تطوير لقاحات COVID-19 بسرعة كبيرة؟

تم تطوير لقاحات COVID-19 لتكون آمنة وفعالة. قد يبدو أنه تم تطويرها بسرعة، لكن الباحثين في جميع أنحاء العالم يعملون معاً بجد واجتهاد لتطوير لقاحات COVID-19 منذ بداية الجائحة. تم اتباع نفس الاجراءات للقاحات أخرى، ولم يتم تخطي أي خطوات.

تم تطوير لقاحات COVID-19 الآمنة والفعالة بسرعة بسبب:

- تم استثمار مبالغ كبيرة لتمويل البحث والتصنيع؛
- تُوِّفِر التكنولوجيا الجديدة لتسريع تطويره
- يعمل الباحثون والعلماء والمصنعون في جميع أنحاء العالم جنباً إلى جنب
- أجريت بعض خطوات التجارب السريرية وعملية الموافقة في نفس الوقت، بدلاً من الواحدة تلو الأخرى.

وقد أعطانا هذا الحصول على اللقاحات في أسرع وقت ممكن.

كيف تحمينا لقاحات COVID-19؟

تُعَلِّم لقاحات COVID-19 جسمك التعرف على ومكافحة الفيروس الذي يسبب COVID-19. وهم لا يحتوتون على COVID-19. لا يمكنك الإصابة ب COVID-19 من تلقي التطعيم. اللقاحات هي وسيلة آمنة لبناء الحماية ضد الفيروس في الجسم، بدون التسبب في المرض.

ثبت أن لقاحات COVID-19 المعتمدة للاستخدام في أستراليا جيدة جداً في الحماية ضد الأمراض الشديدة والذهاب الى المستشفى والموت.

يمكنك التحدث إلى طبيبك حول لقاحات COVID-19 ولماذا يُعد التطعيم جزءاً مهماً من الحفاظ على سلامة وصحة المجتمع.

ما هي الآثار الجانبية التي يجب أن أتوقعها من لقاحات COVID-19؟

يمكن أن يكون لجميع اللقاحات بعض الآثار الجانبية. هذه الآثار الجانبية عادة ما تكون خفيفة و تستمر لبضعة أيام فقط.

يمكن أن تشمل الآثار الجانبية:

- ألم في الذراع بعد الحقنة
- حمى
- آلام في العضلات
- صداع.

إذا كانت لديك أي أسئلة أو مخاوف بعد التطعيمات، اتصل بعيادة التطعيم أو الطبيب.

إذا كانت أعراضك شديدة ، يمكنك الاتصال بـ triple zero (000) لطلب سيارة إسعاف لنقلك إلى المستشفى. إذا كنت لا تتحدث الإنجليزية، فعندما تتصل بـ triple zero (000) ، اطلب " ambulance " وابقى على الخط و اطلب مترجم .

سيتمثل خط خدمات الطوارئ triple zero (000) بخدمة Translating and Interpreting Service ويربطك بمترجم باستخدام خط الأولوية على مدار 24 ساعة في اليوم ، كل يوم من أيام السنة

يمكن أن تشمل الأعراض الشديدة ما يلي:

- صعوبة في التنفس
- الصغير،
- تسارع ضربات القلب ، أو
- الانهيار.

هناك علاقة بين لقاح AstraZeneca vaccine وحالة نادرة جداً، التي تتضمن تخثر الدم، وانخفاض مستويات الصفائح الدموية في الدم. اقرأ المزيد عن هذا على:

<https://www.health.gov.au/resources/publication/astrazeneca-information-other-languages>

هل يمكن للأطفال تلقي لقاحات COVID-19؟

يوصي خبراء التحصين الأسترالي (Australian Technical Advisory Group on Immunisation (ATAGI)، بأنه يمكن للأطفال الذين تبلغ أعمارهم من 5 إلى 11 عاماً تلقي لقاح [Pfizer COVID-19 vaccine للأطفال](#). لقاح Pfizer للأطفال هو ثلث حجم الجرعة التي يتلقاها الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 12 عاماً وما فوق.

توصي ATAGI بأنه يمكن للأطفال الذين تبلغ أعمارهم بين 6-11 عاماً تلقي لقاح [Moderna COVID-19 vaccine للأطفال](#). لقاح Moderna للأطفال هو نصف حجم الجرعة التي يتلقاها الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 12 عاماً وما فوق.

يمكن للأطفال الذين تبلغ أعمارهم 12 عاماً أو أكثر تناول جرعات عادية من لقاحات Pfizer أو Moderna COVID-19. لمعرفة ما هو مناسب لك ولعائلتك، تحدث مع طبيبك.

هل يجب على السيدات الحوامل والمرضعات تلقي التطعيم؟

إذا كنتِ حاملاً، أو مرضعة أو تخططين للحمل، يوصى بتلقي لقاحات Pfizer أو Moderna أو Novavax COVID-19.

إذا أصبت بفيروس COVID-19، فقد تكوني أنتِ وطفلك الذي لم يولد بعد في خطر. يكون هناك:

- خطر الحاجة للذهاب إلى المستشفى أعلى
- فرصة أكبر قليلاً لولادة الطفل في وقت مبكر واحتاجين إلى الذهاب إلى مستشفى
- ارتفاع خطر ولادة جنين ميت (ولادة طفل غير حي).

يُعد تلقي تطعيم ضد COVID-19 في أي وقت أثناء الحمل هو أفضل طريقة لتقليل هذه المخاطر.

يحتوي لقاحا Moderna و Pfizer على كميات كبيرة من البيانات الواقعية لإظهار أنها آمنة للنساء الحوامل والمرضعات.

لا توجد بيانات سريرية حول سلامة لقاح Novavax لدى النساء الحوامل أو المرضعات. ومع ذلك، لا توجد مخاوف تتعلق بالسلامة الحالية بشأن تلقي Novavax أثناء الحمل لأنه ليس لقاحاً حياً. تتم مراقبة سلامة لقاح Novavax لدى النساء الحوامل والمرضعات.

إذا كنتِ مُرضعة وغير قادرة على تلقي لقاحات Pfizer أو Moderna أو Novavax، فيمكنك النظر في تلقي تطعيم AstraZeneca، إذا كانت الفوائد تفوق مخاطر التطعيم بالنسبة لكِ. بغض النظر عن التطعيم الذي تتلقينه، لست بحاجة إلى التوقف عن إرضاع طفلك في أي وقت.

للمزيد من المعلومات حول سلامة لقاحات COVID-19 أثناء الحمل أو الرضاعة الطبيعية، تحدثي إلى طبيبك. يمكن العثور على المزيد من المعلومات على:

www.health.gov.au/resources/translated/pregnancy-and-covid-19-vaccines-other-languages

هل يمكن أن تسبب لقاحات COVID-19 العقم عند البالغين أو العقم عند الأطفال في المستقبل؟

لا يوجد دليل علمي يُظهر أن لقاحات COVID-19 تسبب عدم الخصوبة أو العقم عند الرجال أو النساء.

لا يوجد أيضاً دليل علمي على أن لقاحات COVID-19 تؤدي إلى مشاكل في الخصوبة في المستقبل عند الأطفال.

لن توافق TGA على لقاح للاستخدام في أستراليا ما لم يكن آمناً وفعالاً. هذا يعني أن TGA لن توافق على لقاح إذا كان يؤثر على خصوبة الذكور أو الإناث. لم تجد الدراسات أن العقم يُعد من الآثار الجانبية لأي لقاح COVID-19 تم اعتماده من TGA.

كم عدد الجرعات التي أحتاجها من لقاحات COVID-19؟

يقول الخبراء الطبيون من ATAGI أنه من الأفضل لك تلقي مجموعة التطعيم الأولية ضد COVID-19 بجرعتين من نفس التطعيم. وهذا أيضاً ما وافقت عليه TGA.

سيخبرك الشخص الذي يقوم بتطعيمك بنوع اللقاح الذي تلقيتَه، ومتى يجب عليك حجز موعدك الثاني.

لكي تعتبر "مواكباً لأحدث" لقاح COVID-19 الخاص بك، يجب أن تكون قد حصلت على جميع الجرعات الموصى بها لعمرِكَ واحتياجاتك الصحية.

يتضمن ذلك جرعة أولية ثالثة للأشخاص الذين يعانون من نقص المناعة، وجرعة معززة لكل من يبلغ من العمر 16 عاماً وأكثر.

ما الفرق بين الجرعة الثالثة والجرعة المعززة؟

يوصى بجرعة ثالثة من لقاح COVID-19 للأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 5 سنوات وأكثر. والذين يعانون من نقص المناعة الشديد كي يبقوا مواكبون لأحدث تطعيمات COVID-19. هذا لأن الأشخاص الذين يعانون من نقص المناعة الشديد معرضون بشكل أكبر للإصابة بمرض شديد من COVID-19 ويحتاجون إلى جرعة ثالثة للحصول على أفضل حماية ضد الفيروس. إذا كنت تعاني من

نقص المناعة الشديد ، يجب أن تحصل على جرعتك الثالثة بعد شهرين من تلقيك الجرعة الثانية ولا يتجاوز 6 أشهر بعد ذلك. إذا لم تكن متأكدًا ما إذا كان يجب أن تحصل على جرعة ثالثة، تحدث إلى طبيبك لمعرفة الأفضل لك.

في حين يوصى بجرعة معززة للأشخاص الذين يعانون من نقص المناعة الشديد، سيتم اعتبار ما مجموعه 3 جرعات فقط على أنها مواكبة.

يوصى بجرعات معززة لكل من يبلغ من العمر 16 عاماً وأكثر ممن أتموا مجموعة الجرعات الأولية من تلقيح COVID-19 للحفاظ على حالة التطعيم الخاصة بهم مواكبة للأحدث. نظراً لأن المناعة من لقاحات COVID-19 تقل بمرور الوقت، وتزيد الجرعات المعززة من حمايتك من الإصابة بالمرض الشديد أو الوفاة من COVID-19. ستمنحك الجرعة المعززة المزيد من المساعدة في الحفاظ على حمايتك من COVID-19 لفترة أطول.

يُنصح الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 16 عاماً والذين يعانون من نقص المناعة الشديد بتلقي جرعة معززة (رابعة) ، بعد 3 أشهر من الجرعة الثالثة.

متى يجب أن أتلقى جرعتي المعززة ضد لقاح COVID-19؟

ستساعد الجرعة المعززة في الحفاظ على حمايتك من COVID-19. للحفاظ على وضعك مواكباً لأحدث لقاح COVID-19 الخاص بك ، يجب أن تتلقى جرعة معززة إذا:

- كنت تبلغ من العمر 16 عاماً أو أكثر ، و
- قد أكملت مجموعة التطعيم الأولية ضد COVID-19 منذ 3 أشهر على الأقل.

يجب أن تتلقى الجرعة المعززة في موعد لا يتجاوز 6 أشهر بعد الانتهاء من مجموعة الجرعات الأولية لتلقيح COVID-19.

لن يتم اعتبارك مواكباً للقاحات COVID-19 الخاصة بك وبدلاً من ذلك ستعتبر "متأخراً" إذا لم تكن قد حصلت على جرعة معززة في الإطار الزمني الموصى به لعمرك أو حالتك الصحية.

تعني حالة اللقاح "المتأخرة" أنك لن تحصل على الشهادة الرقمية الحالية للقاح COVID-19

يجب أيضاً على النساء الحوامل والأشخاص الذين يعانون من نقص المناعة الذين تتراوح أعمارهم بين 16 عاماً الحصول على جرعة معززة في نفس الأطر الزمنية الموصى بها.

يمكنك الحصول على لقاح Pfizer كجرعة معززة إذا كان عمرك 16 عاماً وأكثر. يمكنك الحصول على لقاح Pfizer أو Moderna كمعزز إذا كان عمرك 18 عاماً أو أكثر. لا يهم نوع اللقاح الذي استخدمته في أول جرعتين. يوصى بلقاح AstraZeneca فقط كجرعة معززة إذا لم يكن بإمكانك الحصول على لقاح Pfizer أو Moderna لأسباب طبية. لا يوصى حالياً بجرعات معززة للأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 5 إلى 15 عاماً.

كيف يمكنني إيجاد عيادة تطعيم COVID-19 لحجز جرعتي الثالثة أو جرعتي المعززة؟

يمكنك إيجاد عيادة وحجز لقاح COVID-19 باستخدام [Vaccine Clinic Finder](https://covid-vaccineclinicfinder.gov.au/) على [https://covid-](https://covid-vaccineclinicfinder.gov.au/) أو بالاتصال على 1800 020 080. لخدمات الترجمة الشفوية، اختر الخيار 8.

يمكنك أيضاً التحدث مع طبيبك أو صيدلية المجتمع المشاركة حول حجز تطعيمك.

هل لقاحات COVID-19 إلزامية في أستراليا؟

التطعيم لـ COVID-19 طوعي. يمكن للناس اختيار ما إذا كانوا يريدون تلقي تطعيمات COVID-19. لن تتلقى غرامة لعدم تلقيك تطعيمات COVID-19.

التطعيم ضد COVID-19 هو مطلب للأشخاص العاملين في رعاية المسنين السكنية. وبعض الولايات والأقاليم لديها متطلبات تطعيم خاصة بها أيضاً. هناك إعفاءات للأشخاص غير القادرين على التطعيم بسبب ظروف طبية.

هل يمكنني الحصول على أحد اللقاحات من الخارج؟

يمكن للناس في أستراليا تلقي فقط لقاحات COVID-19 التي وافقت عليها TGA للاستخدام في أستراليا. وقد تتم أيضاً الموافقة على هذه اللقاحات للاستخدام في بلدان أخرى. يجب ألا تحاول شراء لقاح COVID-19 عبر الإنترنت، حيث من المحتمل أن يكون غير آمن أو مزيف.

بمجرد أن أحصل على تطعيم، هل ما زلت بحاجة إلى اتخاذ احتياطات أخرى لوقف انتشار COVID-19؟

بعد تلقي التطعيم، لا يزال من المهم بالنسبة لك مواصلة الممارسات الآمنة لمنع انتشار COVID-19.

ابقَ على بُعد 1.5 متراً من الآخرين، واغسل يديك بانتظام بالماء والصابون، وابقَ في المنزل عندما تكون مريضاً، واجراء فحص COVID-19 وارتدي كمامة عند الحاجة.

هل ستعمل لقاحات COVID-19 إذا تغير COVID-19؟

جميع الفيروسات تتغير مع مرور الوقت. وهذا ما يسمى بالتحول. تُظهر الأدلة العلمية أن لقاحات COVID-19 بإمكانها أن تساعد في الوقاية من المرض الشديد من أنواع جديدة (طفرات) من COVID-19. تواصل TGA النظر عن كثب إلى هذا كجزء من عمليات الموافقة والمراقبة المعتادة.

قد تحتاج لقاحات COVID-19 في المستقبل إلى التغيير لمواجهة طفرات جديدة مختلفة. يحدث هذا حالياً مع لقاح الإنفلونزا كل عام. يواصل الباحثون ومصنعو اللقاحات البحث في هذا الأمر.

هل لا يزال الأشخاص الذين أصيبوا بـ COVID-19 بحاجة إلى التطعيم؟

إذا كنت قد أصبت بـ COVID-19 وتعافيت، فلا يزال يتعين عليك تلقي جرعة لقاح COVID-19 التالية للحفاظ على حالة التطعيم ضد COVID-19 "المحدثة". فالفيروس الذي يسبب COVID-19 هو فيروس جديد، ولا يعرف الخبراء المدة التي قد تستمر فيها المناعة الطبيعية بعد الإصابة. من المحتمل جداً أن تقل الحماية من تكرار العدوى بمرور الوقت.

من الآمن للأشخاص الذين أصيبوا بفيروس COVID-19 تلقي اللقاح أو جرعة معززة. يمكن القيام بتلقي جرعتك التالية بمجرد اختفاء أعراض الفيروس. ومع ذلك، يمكنك أيضاً الانتظار لتلقي جرعتك التالية لمدة تصل إلى 4 أشهر بعد الإصابة. قد يختار بعض الناس أن يتم تطعيمهم في وقت مبكر.

هل سيحميني لقاح الإنفلونزا من الإصابة بـ COVID-19؟

الإنفلونزا (Flu) و COVID-19 كلاهما فيروسات، لكنهما ليسا متشابهين. لا يعطي لقاح الإنفلونزا مناعة ضد أو حماية ضد COVID-19.

لن يوفر لقاح COVID-19 الحماية من الأنفلونزا. يوصى بتلقي كل من تطعيم الإنفلونزا وتطعيم COVID-19، يمكن إعطاء الناس لقاح COVID-19 ولقاح الأنفلونزا في نفس اليوم.

هل يجب أن أتناول دواء سيولة الدم قبل تلقي تطعيم AstraZeneca؟

كلا، لا تحتاج تناول أدوية سيولة الدم قبل تلقي تطعيمك.

يجب أن تستمر في تناول أدويةك المعتادة ما لم ينصحك طبيبك بذلك.

هل ستغير لقاحات COVID-19 الحمض النووي DNA أو الجينات الخاصة بي؟

كلا، فلقاحات COVID-19 لا تغير الحمض النووي أو الجينات الخاصة بك .

تستخدم بعض لقاحات COVID-19 الجديدة جزيئاً من الحمض النووي RNA (mRNA) لتُخبر جسمك بعمل إستجابة مناعية ضد COVID-19. ولا تصيبك اللقاحات ب COVID-19.

الحمض النووي DNA هو نوع مختلف من جزيء الحمض النووي RNA في لقاحات mRNA. لا يعمل mRNA أي شيء للحمض النووي الخاص بك، ويتعطل بعد وقت قصير من دخوله جسمك.

هل سيجمع اللقاح حمضي النووي DNA أو الجينات الخاصة بي؟

كلا. عندما تحصل على لقاح، فإنه يدخل جسمك، وعادةً إلى العضلة في ذراعك من أعلى. يتم إعطاء لقاحات COVID-19 في أستراليا عن طريق الحقنة. لا يتم جمع الجينات و الحمض النووي DNA من خلال تلقيك تطعيم COVID-19.

هل ستربطني لقاحات COVID-19 بالإنترنت؟

كلا، فلقاحات COVID-19، لن – ولا يمكنها – توصيلك بالإنترنت. اللقاح هو منتج طبي وليس رقمي.

هل تحتوي لقاحات COVID-19 على رقائق صغيرة أو تقنية تتبّع؟

كلا، لا يحتوي أي من لقاحات COVID-19 على برامج أو رقائق صغيرة. لا يمكنهم تتبّع الناس.

هل يمكن أن تؤدي لقاحات COVID-19 إلى الإصابة ب COVID-19؟

لا يحتوي أي من لقاحات COVID-19 المعتمدة في أستراليا على الفيروس الحي الذي يسبب COVID-19. هذا يعني أن لقاح COVID-19 لا يمكن أن يجعلك مريضاً ب COVID-19، وأن اللقاح لا يجعلك أن تنثر من الفيروس.

يمكن لبعض الآثار الجانبية من لقاحات COVID-19، مثل الحمى وآلام في العضلات والتعب، أن تبدو كأعراض COVID-19. يمكن أن تكون هذه الأعراض علامة على أن الجسم يبني حماية ضد فيروس COVID-19.

هل تحتوي لقاحات COVID-19 على منتجات حيوانية؟

لا تحتوي لقاحات COVID-19 المعتمدة للاستخدام في أستراليا على أي منتجات حيوانية أو لحوم أو بيض.

ما ذا يعتقد القادة الدينيين عن لقاحات COVID-19؟

يسمح العديد من القادة الدينيين بلقاحات COVID-19 المعتمدة للاستخدام في أستراليا.

في 22 ديسمبر 2020، دعم الفاتيكان استخدام لقاحات COVID-19. يمكن قراءة بيان الفاتيكان على:

https://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_con_cfaith_doc_20201221_nota-vaccini-anticovid_en.html

أصدر Australian Fatwa Council فتوى بشأن لقاح COVID-19 في 13 فبراير 2021. وصدرت الفتوى بعد البحث عن لقاحات COVID-19 ومناقشتها مع أطباء وخبراء طبيين مسلمين موثوقين وذوي مصداقية. تنص الفتوى على أن لقاحات COVID-19 الأسترالية مسموح بها وفقاً للشرعية الإسلامية. يمكنك قراءة Australian Fatwa Council's COVID-19 Vaccine Fatwa على: <https://www.anic.org.au/fatwa-council/>

أصدر مؤتمر Great Synagogue Sydney خطبة في 27 فبراير 2021 يدعم استخدام لقاحات COVID-19. يمكنك قراءة الخطبة على: <https://www.greatsynagogue.org.au/rabbiscorner.html>

نشرت Australian Islamic Medical Association بياناً عن لقاحات COVID-19 في 13 أغسطس 2021. يمكنك الاطلاع على البيان على: <https://aimamed.com.au/feature-content/>

من الذي يمكنني الاتصال به إذا كانت لدي أسئلة حول لقاحات COVID-19؟

إذا كنت ترغب في التحدث إلى شخص ما حول لقاحات COVID-19، فاتصل بخط National Coronavirus Helpline على 1800 020 080. خط المساعدة متوفر 24 ساعة كل يوم. لخدمات الترجمة الشفوية، اختر الخيار 8.

يمكنك معرفة المزيد على الموقع الإلكتروني الخاص بـ Department of Health حيث تتوفر المعلومات بـ 63 لغة www.health.gov.au/covid19-vaccines-languages

يمكنك أيضاً التحدث إلى طبيبك أو أخصائي الرعاية الصحية المحلي.

من المهم أن تظل على اطلاع من خلال مصادر موثوقة ورسمية مثل Department of Health أو Therapeutic Goods Administration .